



La Toux de Chenil

La toux de chenil (ou trachéo-bronchite infectieuse) est une maladie des voies respiratoires du chiot et du chien, atteignant principalement les animaux vivant en collectivité (élevages, refuges, expositions canines...).

Elle est due à plusieurs agents : bactéries et virus associés. La contamination se fait par contact avec un chien malade (postillons) dus à la toux. Le chien développe la maladie 5 à 10 jours après l'exposition aux microbes. Les symptômes Essentiellement une toux sèche, forte et quinteuse. On a souvent l'impression que le chien veut cracher quelque chose. L'état général est souvent atteint et la fièvre est fréquente. On peut observer également une conjonctivite (œil rouge) et des écoulements par le nez et les yeux. Des complications bactériennes sont enfin possibles : forte fièvre, chien plus abattu, toux devenant grasse, la maladie évolue alors en bronchopneumonie, qui peut être **mortelle chez les chiots**. Le traitement Il est long : au minimum une dizaine de jours. La toux a tendance à s'auto-entretenir : certains cas anciens nécessitent jusqu'à trois semaines de traitement. Le vétérinaire utilise une combinaison d'antibiotiques, d'anti-tussifs et d'anti-inflammatoires.

La prévention plusieurs vaccins existent contre les différents agents de la toux de chenil. La protection n'est pas efficace à 100% mais permet d'atténuer considérablement les symptômes de la maladie. Pour cela, nous vous conseillons de vacciner votre compagnon. Cela peut être fait dès l'âge de 6 semaines sous forme d'injections, ou de pulvérisations dans le nez dès l'âge de 2 semaines. Le protocole qui dépend des vaccins utilisés (il faut en général deux injections avec un rappel annuel) est à adapter en fonction des risques pour votre animal: demandez conseil à votre vétérinaire.

La vaccination permet d'éviter ce genre de complications très graves. Nous vous la conseillons vivement dans les situations à risque: chenils, élevages, expositions canines.